

Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Zeer sterk ras
- Hoog drogestofgehalte
- Goede droogte- en hittetolerantie
- Goede Resistentie tegen kringerheid
- Goede bewaarbaarheid

Morfologie

Rijptijd	54	Laat
Opbrengst rijp	117	Zeer hoog
Grofheid	82	Grof
Knolvorm	Rond-ovaal / Ovaal	
Knolaantal	12-14	
Vleeskleur na koken	Geel	
Schilkleur	Geel	

Toleranties

Kiemrust	66	Gemiddeld
Sencor gevoeligheid	60	Vrij gevoelig
Loofontwikkeling	70	Goed
Blauwgevoeligheid	20	Vrij gevoelig
Onderzeeërvorming	90	Niet gevoelig
Droge stof	23,3	
OWG	432	

Resistenties

Kringerigheid	99	Hoog resistent
Phytophthora loof	56	Weinig vatbaar
Phytophthora knol	60	Weinig vatbaar
Schurft	65	Weinig vatbaar
Poederschurft	69	Weinig vatbaar
YN-virus	99	Hoog resistent
Yntn-virus knoltolerantie	99	Tolerant

Aardappelmoeheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3	
9				+ Geen officiële meting / Stet eigen meting
Wratziekte				
F1	F2	F6	F18	
10				

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 175 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- Een goede fosfaat en kali bemesting kan resulteren in een hogere opbrengst.
- Kali: ca 250 kg voor het poten. Bij Kali arme gronden nog een overbemesting van 150 kg na de knolzetting toedienen.
- Een verse kaligift wordt aangeraden om blauw te voorkomen.
- Mangaan en magnesium zorgen voor een vitaal gewas en voorkomen vroegtijdige afrijping.

Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

Voorbehandeling en poten

- STORM heeft een normale kiemrust.
- De kiemen moeten worden afgehard, het ras heeft zwakke kiemen.
- Voor STORM wordt geadviseerd om altijd pootgoed en de bodem tegen Rhizoctonia te behandelen.
- De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op vruchtbare en lichte grondsoorten.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.

Plantafstanden

- Markt: 40-90 mm.

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
- 30/40	54.000	25	21
- 40/50	44000	30	25
- 50/60	38.000	35	29

- Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.
- Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Teelt

- Mooi dekkend gewas.
- Normale opkomst.
- Het gebruik van Metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Indien na-opkomst toepassing; gebruik het lage dosering systeem.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.

Loofdoding en oogst

- Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.

Bewaring

- Bewaren bij een stabiele temperatuur van 8°C.
- Voor langdurige opslag moet gebruik worden gemaakt van kiemremmersmiddelen.