

Consejos generales para la producción de consumo

- Piel brillante y muy atractiva
- Alto rendimiento
- Buen contenido de materia seca
- Apropia para hacer patatas fritas caseras
- Alta resistencia a virus Yn
- Buen almacenamiento

Morfología

Maduración	63	Semi- tardia
Producción	103	Bastante alta
Tamaño del tuberculo	81	Calibre grande
Forma		Oval
Número de tubérculos		12-14
Color carne cocinar		Amarilla clara
Color de piel		Amarilla

Resistencias

Spraing	98	Buena resistencia
Mildiú en planta	53	Sensible
Mildiú en el tubérculo	28	Muy sensible
Sarna común	57	Poco sensible
Sarna verrugosa	39	Muy sensible
Virus Yn	63	Poco sensible
Tol. Yntn tubérculo	99	Tolerante

Res. a nemátodos

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3	
9		+5	+3	+ No probado por un Organismo oficial / Datos internos de Stet
Roña				
F1	F2	F6	F18	
9		8		

Tolerancias

Período de dormencia	89	Muy largo
Emergencia	70	Normal
Sens. Metribuzin	53	Sensible
Desarrollo de la planta	79	Muy bueno
Golpeo interno	19	Bastante sensible
Fenómeno patatitas	86	No sensible
Materia seca		22,9
Peso bajo agua		424

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): aproximadamente 100% en comparación con otras variedades medio-tardías (indicación 225 kg. N incluyendo las reservas del suelo).
- Fertilización con Potasio y Fosfato como consejo habitual.
- Para evitar hematomas, utilice potasio fresco
- LA VIDA es susceptible a la deficiencia de magnesio, por lo tanto fertilizar con micro-elementos.

LA VIDA



Consejos generales para la producción de consumo

Cultivo

- Si el brote apical está presente, hay que quitarlo y plantar con pequeñas yemas blanquecinas
- Tratar siempre la semilla de LA VIDA y el suelo contra Rhizoctonia
- Evitar terrenos con alta susceptibilidad a la sarna común.

Densidad de plantación

	Distancia entre		
caballones			
-28/35	55.000	24	20
-35/55	38.000	35	29

- Profundidad de plantación: 3 cm más profundo de lo normal.
- Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta
- La variedad es un poco sensible a la sarna común.

Destrucción de las plantas

- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha
- LA VIDA es moderadamente susceptible a los daños mecánicos, reducir caídas altas

Almacenamiento

- Cuidar el periodo de cicatrización de la herida