

Consejos generales para la producción de consumo

- Variedad muy fuerte
- Materia seca alta
- Buena resistencia a la sequía y al calor
- Alta resistencia a spraing
- Buen almacenamiento

Morfología

Maduración	54 Tardía
Producción	117 Muy alta
Tamaño del tubérculo	82 Calibre grande
Forma	Redonda-oval / Oval
Número de tubérculos	12-14
Color carne cocinar	Amarilla
Color de piel	Amarilla

Tolerancias

Período de dormencia	66 Medio
Sens. Metribuzin	60 Bastante sensible
Desarrollo de la planta	70 Bueno
Golpeo interno	20 Bastante sensible
Fenómeno patatitas	90 No sensible
Materia seca	23,3
Peso bajo agua	432

Resistencias

Spraing	99 Buena resistencia
Mildíu en planta	56 Poco sensible
Mildíu en el tubérculo	60 Poco sensible
Sarna común	65 Poco sensible
Sarna verrugosa	69 Poco sensible
Virus Yn	99 Buena resistencia
Tol. Yntn tubérculo	99 Tolerante

Res. a nemátodos

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9			
Roña			
F1	F2	F6	F18
10			

+ No probado por un Organismo oficial / Datos internos de Stet

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno: Aprox. 175kg. N/ha incluyendo las reservas del suelo.
- Una buena fertilización con Fósforo y Potasio puede aumentar la producción.
- Potasio (K) aprox. 250kg. K/ha antes de plantar. En los tipos de suelo con bajo nivel de potasio, después de la tuberización, la aplicación adicional de 100 kg.
- Para evitar hematomas, utilice potasio fresco
- Manganeso y Magnesio proporcionan una vegetación fuerte y previenen de una senescencia prematura

Consejos generales para la producción de consumo

Cultivo

- STORM tiene una dormencia media
- Los brotes deben endurecerse, la variedad tiene brotes débiles
- Tratar siempre la semilla de STORM y el suelo contra Rhizoctonia
- La mejor calidad se obtiene en terrenos fértiles y ligeros
- Tomar la precaución de hacer buenos caballones para evitar el verdeamiento

Densidad de plantación

- Mercado: 40-90 mm.

	Distancia entre		
caballones			
- 30/40	54.000	25	21
- 40/50	44000	30	25
- 50/60	38.000	35	29

- Profundidad de plantación: 3 cm más profundo de lo normal.
- Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Período de cultivo

- Buen cultivo de cobertura
- La emergencia es normal.
- El uso de Metribuzin se recomienda en pre-emergencia. En post-emergencia utilizar dosis bajas.
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.

Destrucción de las plantas

- Prevenir los daños mecánicos para mejorar el almacenamiento.

Almacenamiento

- Almacenar a una temperatura estable de 8°C
- Para almacenamientos largos se necesita utilizar inhibidores de brotación.