

SH C 1010



Consejos generales para la producción de consumo

- Tamaño y forma uniforme del tubérculo
- Alto número de tubérculos
- Alta producción
- Materia seca alta
- Alta resistencia a spraing



Morfología

Maduración	63	Semi- tardía
Producción	94	Bien
Tamaño del tuberculo	79	Medio
Forma		Redonda / Redonda-oval
Número de tubérculos		15-17
Color carne cocinar		Amarilla
Color de piel		Amarilla oscuro

Tolerancias

Período de dormencia	94	Muy largo
Sens. Metribuzin	60	Bastante sensible
Desarrollo de la planta	77	Bueno
Golpeo interno	26	Muy sensible
Fenómeno patatitas	90	No sensible
Materia seca		24,3
Peso bajo agua		453

Resistencias

Spraing	99	Buena resistencia
Mildiú en planta	58	Poco sensible
Mildiú en el tubérculo	23	Muy sensible
Sarna común	65	Poco sensible
Sarna verrugosa	68	Poco sensible
Virus Yn	43	Poco sensible
Tol. Yntn tubérculo	99	Tolerante

Res. a nemátodos

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
8			
Roña			
F1	F2	F6	F18
10			

+ No probado por un Organismo oficial / Datos internos de Stet

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): aproximadamente 230 kg. N/Ha incluyendo las reservas del suelo.
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Fertilización con Fosfatos de acuerdo con los consejos standard.
- Para evitar hematomas, utilice potasio fresco
- Manganeso y Magnesio proporcionan una vegetación fuerte y previenen de una senescencia prematura
- Prestar atención en mantener la planta vigorosa

SH C 1010



Consejos generales para la producción de consumo

Cultivo

- SH C 1010 tiene una dormencia larga
- Tratar siempre la semilla de SH C 1010 y el suelo contra Rhizoctonia
- SH C 1010 puede ser cultivada en todo tipo de suelos
- Plantar SH C 1010 3 cm más profundo para obtener un sistema radicular más fuerte y una mejor absorción de los nutrientes
- Plantando con yemas blanquecinas, se obtienen los mejores resultados.

Densidad de plantación

	Distancia entre		
caballones			
-30/40	52.000	26	21
-40/50	40000	33	28
-50/60	34.000	39	33

-Profundidad de plantación: 3 cm más profundo de lo normal.
-Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Período de cultivo

- El uso de Metribuzin se recomienda en pre-emergencia. En post-emergencia utilizar dosis bajas.
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.
- SH C 1010 no es sensible a la necrosis internas
- El riego es aconsejable bajo condiciones de humedad.

Destrucción de las plantas

- Cosechar SH C 1010 con cuidado, a materias secas más altas puede ser sensible al golpeo

Almacenamiento

- SH C 1010 tiene una dormencia larga y un buen almacenamiento
- Almacenar a una temperatura estable de 8°C