
TRIPLO



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

- Qualités de frites ménagères
- Variété polyvalente
- Bonne résistance à la Mildiou



Morphologie

Type de cuisson		B - Légèrement farineuse
Maturité	70	Demi-hâtive
Rendement à maturité	104	Assez élevé
Grosseur du tubercule	82	Gros
Forme		Rond-ovale / Ovale
Nombre de tubercules		9-11
Chair après cuisson		Jaune clair
Couleur de peau		Jaune
Fruits		Peu des fruits

Tolérances

Période de dormance	54	Assez courte
Levée	80	Vite
Sens. au Metribuzin	51	Sensible
Développement du feuilla	76	Bon
Noircissement interne	8	Pas de sensibilité
Boulage	80	Pas de sensibilité
Matière sèche		20,2
Poids sous l'eau		385

Résistences

Virus rattle du tabac Mildiou du feuillage Mildiou du tubercule Gale commune Gale poudreuse Virus Yn Yntn virus sur tubercule			Peu sensible Sensible Peu sensible Sensible Très sensible Peu sensible Peu sensible				
Y III(I) V	irus sur t	ubercule	;	Peu sensible			
Nématodes							
Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3				
9	+3			+ Non testées par un			
Galle Verruqueuse				Organisme officiel / Données internes Stet			
F1	F2	F6	F18				
10	3	3	3				

Fertilisation

- -Azote (N): env. 200 kg N / ha reliquats inclus.
- -Fertilisation Phosphore/Potasse: selon analyse de sol.

TRIPLO



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

Plantation

- -TRIPLO a une dormance courte.
- -Si un germe apical est présnt, retirez-le et planter des plants au stade points blancs.
- -Pré germiner n'est pas necessaire.
- -Evitez les sols à forts risques de galles commune
- -Planter les plants de gros calibre plus profondément pour éviter les tubercules verdis.
- -Ne pas planter dans des sols trop froids ce qui entrainerait un risque d'émergence trop irrégullière.

Densité du peuplement

	Distance entre les					
buttes						
-28/35	60.000	22	19			
-35/50	50.000	27	22			
-35/55	48.000	28	23			
-50/60	34.000	39	33			
-Profondeur de plantation: 3 cm de plus que la normale.						

Culture

- -TRIPLO tubérise dans le haut de la butte.
- -Assez sensible à la Métribuzine, traitez uniquement en pré-levée
- -Sur parcelles présentant un risque de gale commune, pensez à irriguer les cultures au moment de la tubérisation.

Défanage

-TRIPLO a une maturité précoce, le défanage doit se faire aisément.

La conservation

- -Sécher rapidement et garder au sec afin d'eviter l'apparition de gale argentée.
- -TRIPLO est peu sensible au Fusarium.