

Consejos generales para la producción de consumo

- Buena calidad para cocción
- Alta producción
- Apropiaada para hacer patatas fritas caseras
- Alta resistencia a virus Yn

Morfología

Tipo de coccion	AB - Ligeramente firme
Maduración	65 Semi-temprana
Producción	120 Muy alta
Tamaño del tuberculo	83 Calibre grande
Forma	Redonda-oval / Oval
Número de tubérculos	12-14
Color carne cocinar	Amarilla clara
Color de piel	Amarilla

Tolerancias

Período de dormencia	53 Algo corto
Sens. Metribuzin	68 Bastante sensible
Desarollo de la planta	75 Bueno
Golpeo interno	6 No sensible
Fenómeno patatitas	65 Algo sensible
Materia seca	19,7
Peso bajo agua	360

Resistencias

Spraing	Buena resistencia
Mildiú en planta	Sensible
Mildiú en el tubérculo	Poco sensible
Sarna común	Poco sensible
Sarna verrugosa	Sensible
Virus Yn	Buena resistencia
Tol. Yntn tubérculo	Tolerante

Res. a nemátodos

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9			
Roña			
F1	F2	F6	F18
10			

+ No probado por un Organismo oficial / Datos internos de Stet

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): aproximadamente 100% en comparación con otras variedades medio-tempranas.
- Primera aplicación en cobertera (de Nitrógeno) directamente después del inicio de la tuberización.
- Fertilización con Potasio y Fosfato como consejo habitual.

AISHA



Consejos generales para la producción de consumo

Cultivo

- AISHA tiene una dormencia corta
- Mantener la semilla en cámara frigorífica para prevenir su envejecimiento y deshidratación
- Tratar siempre la semilla de AISHA y el suelo contra Rhizoctonia
- Evitar terrenos con alto riesgo a sarna verrugosa o sarna común.
- Tomar la precaución de hacer buenos caballones para evitar el verdeamiento

Densidad de plantación

	Distancia entre		
caballones			
-28/35	50.000	27	22
-35/55	38.000	35	29

- Profundidad de plantación: 3 cm más profundo de lo normal.

- Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta
- AISHA Tiene una buena tolerancia a la metribuzina
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.

Destrucción de las plantas

- Materia seca deseada del 20%
- Para una dormencia óptima, la destrucción de la planta deberá hacerse cuando el cultivo está aduro
- Cuando se cosecha con la planta verde ó al poco tiempo del quemado, asegurarse de un secado y enfriado rápido, para una buena finalización de la piel.
- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha
- AISHA es muy resistente al golpeo, a menos que ocurran condiciones extremas.

Almacenamiento

- AISHA tiene buen almacenamiento, también para períodos largos.
- Para períodos de almacenamiento más largos de 5 meses, se requiere refrigeración