


BRICATA KWS



Consejos generales para la producción de consumo

- Piel brillante y muy atractiva
- Alto rendimiento
- Apropiaada para hacer patatas fritas caseras
- Alta resistencia a spraing



Morfología

Tipo de cocion	AB - Ligeramente firme
Maduración	64 Semi- tardia
Producción	106 Alta
Tamaño del tuberculo	79 Medio
Forma	Oval / Alargada-oval
Número de tubérculos	12-14
Color carne cocinar	Amarilla
Color de piel	Amarilla

Tolerancias

Período de dormencia	66 Medio
Sens. Metribuzin	55 Bastante sensible
Desarrollo de la planta	79 Muy bueno
Golpeo interno	14 Algo sensible
Fenómeno patatitas	90 No sensible
Materia seca	21,0
Peso bajo agua	386

Resistencias

Spraing	Buena resistencia
Mildiú en planta	Poco sensible
Mildiú en el tubérculo	Poco sensible
Sarna común	Sensible
Sarna verrugosa	Poco sensible
Virus Yn	Muy sensible
Tol. Yntn tubérculo	Tolerante

Res. a nemátodos

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+7		
Roña			
F1	F2	F6	F18
10			

+ No probado por un Organismo oficial / Datos internos de Stet

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): aproximadamente 110% en comparación a variedades medio-tempranas (como indicación 275 kg. N incluyendo las reservas del suelo).
- Aplicar 4/5 antes de la plantación y 1/5 en cobertera.
- Primera aplicación en cobertera (de Nitrógeno) directamente después del inicio de la tuberización.
- Fertilización con Fosfatos de acuerdo con los consejos standard.
- Para evitar hematomas, utilice potasio fresco
- El abonado orgánico ayudará mantener el vigor del cultivo
- BRICATA KWS es susceptible a deficiencias minerales, por lo tanto fertilizar con micro-elementos

BRICATA KWS



Consejos generales para la producción de consumo

Cultivo

- BRICATA KWS tiene una dormencia media
- Mantener la semilla en cámara frigorífica para prevenir su envejecimiento y deshidratación
- Antes de la plantación, permitir que la semilla se aclimate a las condiciones locales
- Tratar siempre la semilla de BRICATA KWS y el suelo contra Rhizoctonia
- BRICATA KWS puede ser cultivada en todo tipo de suelos

Densidad de plantación

	Distancia entre		
caballones			
-28/35	50.000	27	22
-35/45	42.000	32	26
-35/50	40.000	33	28
-45/55	38.000	35	29
-50/60 semillas cortada 28	40.000		33

- Profundidad de plantación: Normal.
- Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Período de cultivo

- El uso de Metribuzin se recomienda en pre-emergencia. En post-emergencia utilizar dosis bajas.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad a Phytophthora en la planta.
- BRICATA KWS Sensible a la Alternaria en el tallo

Destrucción de las plantas

- Para mantener una piel brillante y suave, no se debe dejar los tubérculos demasiado tiempo en el suelo después de la destrucción de la planta.
- Cosechar BRICATA KWS con cuidado, a materias secas más altas puede ser sensible al golpeo

Almacenamiento

- Cuidar el periodo de cicatrización de la herida
- Almacenar a una temperatura estable de 6°C
- Cualquier fluctuación de temperatura combinada con condensaciones, puede dar lugar a brotaciones tempranas y un riesgo alto a la Sarna Plateada.
- Para almacenamientos largos se necesita utilizar inhibidores de brotación.